



Istruzioni Preoperatorie:

- 1) Tre settimane prima dell'intervento interrompere l'assunzione di vitamina E o di ogni altro integratore vitaminico (nel caso lo si prenda)
- 2) Per una settimana prima dell' intervento non assumere aspirine né alcun farmaco antiinfiammatorio non steroideo.
- 3) Per una settimana prima dell' intervento non bere alcolici e consumare poco sale, durante i pasti.
- 4) I pazienti in cura con farmaci, in particolare se psicofarmaci o farmaci per il cuore devono consultare il loro medico prima di procedere all'intervento.
- 5) Raccomandiamo a tutti i pazienti di utilizzare minoxidil (5%) per 2-6 settimane prima della procedura, al fine di stimolare la circolazione sanguigna nella zona ricevente ed evitare una perdita da shock nella zona ricevente dopo la procedura.
- 6) La sera prima dell'intervento assumere:
 - 1 gr di antibiotico (amoxicillina e/o cefalosporina) su consiglio del proprio medico curante.
 - 1gr di Paracetamolo
- 7) Due giorni prima dell'intervento sospendere l'uso di Minoxidil (potrete riprendere le applicazioni 7 giorni dopo la procedura).
- 8) Fare colazione la mattina dell'intervento.
- 9) Una settimana prima dell'intervento chirurgico lavare i capelli con detergente normalizzante antiforfora della Linea Tricologica del Dr. De Fazio da usare tutti i giorni.

Domande e Risposte

Dovrò rasarmi la testa?

Se i capelli nella regione donatrice sono più lunghi di 3 cm raseremo una parte della zona donatrice dalla quale verranno rimossi i capelli da spiantare.

Posso tornare a casa il giorno stesso?

Assolutamente si.

Posso passare la notte alla clinica?

No.

Sentirò dolore la sera dell'intervento?

No, per niente.

Posso essere accompagnato da un amico/a o partner?

Si naturalmente.

Quante unità follicolari possono essere posizionate in una seduta operatoria?

Tra 1300-1800 follicoli; in casi selezionati anche 2000-2200.

Ci saranno fasciature in seguito all'intervento?

Non ci sono fasciature, ma di solito applichiamo una garza sulla zona donatrice per 2-4 ore dopo l'intervento.


Dovrò prendere farmaci dopo l'intervento?

Sì, sarà necessario assumere antibiotici per quattro giorni dopo l'intervento.

Ci sarà gonfiore/ edema in seguito all'intervento?

Per procedure fino a 2000 follicoli capillari è molto improbabile, ma per procedure più estese c'è la possibilità di gonfiore / edema nella regione frontale per tre giorni. Trattandosi di una procedura minimamente invasiva, solo una minima percentuale di pazienti ha gonfiore / edema dopo l'intervento.

PORTARE con se il giorno dell'intervento UNO "SPRUZZINO" vaporizzatore per acqua.



Dr Luca De

Direttore

Chires

Fazio

Sanitario

